

EQUIMAX[®]

Reg SAGARPA Q-0042-330

Lo **MÁX**imo en todo el mundo



Virbac

Fundada en 1968.

Presente en 100 países.

Subsidiarias en 25 países.

2,600 empleados alrededor del mundo.

100% dedicada a la Salud Animal

▲ Oficinas centrales

● Subsidiarias

◆ Plantas de producción

■ Centros de Investigación y Desarrollo

Virbac México, S.A. de C.V. Lote 30, Manzana 1, Parque Industrial Guadalajara El Salto Jalisco, CP 45690.
Tel. (33) 50 00 25 50; Fax (33) 50 00 25 15 L NEA 01 800 024 75 75 clientes@virbac.com.mx, www.virbac.com.mx

EQUIMAX[®]

Reg SAGARPA Q-0042-330

Único como su caballo
Simplemente lo **MÁX**imo

En una sola dosis elimina
los parásitos internos
incluyendo las tenias

Virbac
SALUD ANIMAL

LAS TENIAS

INFESTACIONES SUBESTIMADAS




- ★ **85 %** de los veterinarios estiman que solamente el 20 % de los caballos están infestados por Tenias ⁽¹⁾
- ★ **2 de cada 3** caballos están infestados por Tenias ⁽²⁾
- ★ **40 % de la mortalidad de los caballos se debe a los cólicos** ⁽³⁾
- ★ Las Tenias representan el:
 - 22 % de los cólicos espasmódicos
 - 81 % de los cólicos íleo-cecales ⁽⁴⁾



Anoplocephala perfoliata



Anoplocephala magna



Tenias en el intestino

PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN EQUINO

Para un control integral de todos los parásitos se recomienda, como pauta general, el siguiente programa de desparasitación:

4 veces al año (cada 3 meses)

Consulte con su veterinario el programa de desparasitación más adecuado para su caballo.

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN

PARÁSITOS	EQUIMAX	MOXIDECTINA	IVERMECTINA	FENBENDAZOL	PIRANTEL
Grandes estrongilos					
<i>Strongylus vulgaris</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Strongylus edentatus</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Strongylus equinus</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Triodontophorus</i> spp (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
Fases arteriales de <i>Strongylus vulgaris</i>	✓	✓	✓	8 x dosis est. una vez, ó dosis est. 5 días	
Estadios tisulares de <i>S. edentatus</i>	✓	✓	✓		
Pequeños estrongilos					
<i>Cyathostominae</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Cyathostominae</i> (inmaduros)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Cyathostominae</i> (enquistados)		80% aprox.		4 x dosis est. una vez, ó dosis est. 5 días	
Oxiuros					
<i>Oxyuris equi</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Oxyuris equi</i> (inmaduros)	✓	✓	✓	✓	✓
Ascáridos					
<i>Parascaris equorum</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Parascaris equorum</i> (inmaduros)	✓	✓	✓	✓	✓
Vermes pulmonares					
<i>Dictyocaulus arnfieldi</i> (adultos)	✓		✓		
<i>Dictyocaulus arnfieldi</i> (inmaduros)	✓		✓		
Estrongiloides intestinales					
<i>Strongyloides westeri</i> (adultos)	✓	✓	✓	7 x dosis est. una vez	
Tricostrongilidos					
<i>Trichostrongylus axei</i> (adultos)	✓	✓	✓		
Habronema					
<i>Habronema</i> spp (adultos)	✓	✓	✓		
Filáridos					
<i>Onchocerca</i> spp (microfilaria)	✓	✓	✓		
Gastrófilos					
<i>Gasterophilus</i> spp (fase oral y gástrica)	✓	✓	✓		
Cestodos					
<i>Anoplocephala perfoliata</i>	✓				2 x dosis est.
<i>Anoplocephala magna</i>	✓				
<i>Anoplocephaloides mamillana</i>	✓				

(1) DELLA VALLE OLIVIER, "La importancia de la Teniasis de los equinos: Encuesta por sondeo junto con los veterinarios", Tesis veterinaria, ALFORT 2004.

(2) COLLOBERT, "Prevalencia de la Teniasis de los equinos. Estudio a partir de una población de caballos examinados post-mortem", Prat Vet Equine 1997, vol.29 n.3: 149-158.

(3) BOUSSEAU, "Tratamiento de intususcepción cecalocólica en el caballo por colostomía del yeyuno (íleo)" Vet-Rec., 2001 - 149 (1): 16-18

(4) Proudman C.J., "Tapeworm infection is a significant risk factor for spasmodic colic ileal impaction colic in the horse". EQ. Vet. J. (1998) 30 (3) 194-199

EQUIMAX[®]

Reg SAGARPA Q-0042-330



ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA DE IVERMECTINA Y PRAZIQUANTEL

- Ivermectina 18.7 mg
- Praziquantel 140.3 mg

SEGURIDAD DE USO

- Potros de 15 días
- Yeguas gestantes
- Yeguas en lactación
- Sementales

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN (INCLUYE TENIAS)

- Nematodos
- Artrópodos
- Larvas de *Gasterophilus* spp
- Cestodos

TRATAMIENTO HASTA 600 KG DE PESO

- Correcta Dosis de Praziquantel: 1.5 mg / kg que permite una eficacia del 100 % para combatir las Tenias ⁽⁵⁾ (jeringa graduada para tratamiento de acuerdo al peso)

FACILIDAD DE USO

- Gel oral de gran fluidez que se pega en la lengua, evitando el desperdicio
- Práctica jeringa de fácil administración

Una jeringa innovadora para una fácil administración



(5) L. GRISI, "Eficacia de una pasta oral de Ivermectrina + Praziquantel contra tres especies de tenias de caballos" In proceedings of WAAVP, STRESA, Agosto 2001, 016p, 170